

где введены обозначения

$$\Delta^* = \frac{1}{D^*} \{ (c_{\text{эфф}}^{\text{в}} - c_0^{\text{в}}) D^{\text{в}} - (c_{\text{эфф}}^{\text{м}} - c_0^{\text{м}}) D^{\text{м}} \}, \quad A = \frac{2\pi}{a^3} \frac{1}{\ln(8R/r_0)},$$

$$B(R) = \frac{a}{4\pi(1-\nu)} \frac{a^3 G}{kT} \ln \frac{R}{r_0}, \quad D^* = c_0^{\text{в}} D^{\text{в}} + c_0^{\text{м}} D^{\text{м}},$$

c_0 — равновесные концентрации, а индексы «м» и «в» относятся соответственно к междуузельным атомам и вакансиям.

Заметим, что поскольку $c_{\text{эфф}} - \bar{c} \sim Q$, то отличие величины Δ^* от та-ковой в [3] пропорционально разности $Q^{\text{в}} - Q^{\text{м}}$. Другими словами, учет объемных источников точечных дефектов при расчете скоростей роста дислокаций необходим лишь постольку, поскольку $Q^{\text{в}} - Q^{\text{м}} \neq 0$.

Наконец укажем условия, при которых наши выводы верны. Мы предполагали, что диффузия стационарна. Это справедливо, когда за время установления стационарных потоков τ ($\tau \sim l^2/D$) изменение размера дислокационной петли мало по сравнению с ее радиусом. Интересуясь условиями, наложенными на интенсивность радиации, рассмотрим изменение радиуса петли, обусловленное объемными источниками. Из (27) следует, что

$$\frac{\delta R}{R} = \frac{v\tau}{R} \sim \frac{2\pi a^2 R_0^2}{R} |Q^{\text{в}} - Q^{\text{м}}| \frac{l^2}{D} \sim \left(\frac{al}{R} \right)^2 |Q^{\text{в}} - Q^{\text{м}}| \frac{\omega}{D}.$$

Таким образом, интенсивность рождения точечных дефектов должна быть ограничена требованием

$$|Q^{\text{в}} - Q^{\text{м}}| \omega \ll D(\bar{R}/al)^2.$$

В заключение приносим благодарность И. М. Лифшицу за полезное обсуждение работы.

Физико-технический институт
Академии наук Украинской ССР

Институт физики
Академии наук Грузинской ССР

Литература

- [1] И. М. Лифшиц, В. В. Слезов. ЖЭТФ, 35, 479, 1958.
- [2] В. В. Слезов, В. Б. Шикин. ФТТ, 6, 7, 1964.
- [3] А. М. Косевич, З. К. Саралидзе, В. В. Слезов. ФТТ, 6, 3383, 1964.
- [4] З. К. Саралидзе, В. В. Слезов. ФТТ, 7, 904, 1965.
- [5] А. М. Косевич, И. Г. Маргвелашвили, З. К. Саралидзе. ФТТ, 7, 464, 1965.
- [6] I. M. Lifshitz, A. M. Kosevich, Ya. E. Gegusin. J. Phys. Chem. Solids, в печати.
- [7] А. М. Косевич, З. К. Саралидзе, В. В. Слезов. ЖЭТФ, 50, 958, 1966.

DIFFUSION GROWTH OF PORES AND PRISMATIC DISLOCATION LOOPS IN THE PRESENCE OF VOLUME SOURCES OF POINT DEFECTS

A. M. Kosevich, Z. K. Saralidze, V. V. Slezov

A method is proposed for determining the rate of diffusion growth of macroscopic defects (pores or prismatic dislocation loop) in the presence of volume sources of point defects (e.g. radiation). It is shown that with an accuracy to small quantities the rates formally possess the same form as they do in the absence of volume sources. It is found that the effect of radiation must only be taken into account when the mean concentration of defect in the volume is being determined on basis of the total balance of matter.

О ПРЕДЕЛАХ СТАТИСТИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ НЕЛИНЕЙНОГО ВОЛНОВОГО ПОЛЯ

Г. М. Заславский, Р. З. Сагдеев

Рассматривается система нелинейно взаимодействующих колебаний с малой нелинейностью в среде с дисперсией. Выводится условие, при котором рассматриваемую систему можно приближенно описывать статистически. Получен критерий хаотизации фаз волн вследствие нелинейного взаимодействия и найдено характерное время потери фазовой памяти в системе. Это позволяет получить кинетическое уравнение для волн без априорного предположения о хаотических начальных фазах. Найдены спектральные границы применимости кинетического уравнения и установлена связь между временем хаотизации фаз и инкрементом распадной неустойчивости.

Вывод кинетического уравнения для волн в нелинейной турбулентной среде основан на хорошо известном предположении об отсутствии фазовой корреляции между фурье-амплитудами гармоник. Примером может служить кинетическое уравнение для фононов в твердом теле и кинетическое уравнение для волн в слаботурбулентной плазме (см., например, [1]). Предположение о расцеплении фазовых корреляций обычно называется приближением хаотических фаз (ПХФ) и связано со следующим представлением о физической картине процесса. В результате развития неустойчивости или какого-либо другого процесса возбуждается очень большое число волн, нелинейно взаимодействующих друг с другом. Взаимодействие носит распадный характер, т. е. условие резонансов:

$$\sum_j n_j \omega_j = 0$$

(где ω_j — частоты волн, n_j — какие-либо целые числа) может быть выполнено бесконечным числом способов. Сложность взаимодействия и большое число степеней свободы позволяют рассчитывать на возникновение статистического ансамбля волн и, как следствие этого, потерю фазовой корреляции. В настоящей работе исследуются условия, при которых система нелинейно взаимодействующих колебаний может быть с некоторой степенью точности описана статистическими законами, и находится критерий расцепления фазовой корреляции волн. Качественный вывод подобного рода критерия для взаимодействующих гармоник нелинейной струны (так называемая проблема Ферми — Паста — Улама [2]) был дан в работе Израйлева и Чирикова [3]. О связи этой задачи с вопросами, рассматриваемыми в данной статье, будет сказано ниже. Строгий вывод основного кинетического уравнения нелинейного волнового поля в предположении хаотичности начальных фаз был проведен в работе Браута и Пригожина [4]. Полученный ниже критерий стохастизации системы позволяет избавиться от априорной гипотезы ПХФ.

1. Вывод основных уравнений

Мы рассмотрим одномерный пакет волн, потенциальная энергия взаимодействия которых определяется выражением

$$V = \frac{1}{2} \sum_k \omega_k^2 u_k^2 + \beta \sum_{k_1+k_2+k_3=0} V_{k_1 k_2 k_3} u_{k_1} u_{k_2} u_{k_3} + \beta^2 \sum_{k_1+k_2+k_3+k_4=0} V_{k_1 k_2 k_3 k_4} u_{k_1} u_{k_2} u_{k_3} u_{k_4} + \dots \quad (1.1)$$

Здесь β — малый параметр, ядра V удовлетворяют обычным свойствам симметрии:

$V_{k_1 k_2 k_3} = V_{k_2 k_1 k_3} = \dots$, $V_{k_1 k_2 k_3 k_4} = V_{k_2 k_1 k_3 k_4} = \dots$,
 u_k — амплитуда k -й гармоники. Спектр предполагается дискретным с характерным расстоянием между гармониками $\sim \Delta k$ и с расстоянием между частотами

$$\Omega_k = \frac{d\omega_k}{dk} \Delta k. \quad (1.2)$$

Кроме того, будем считать спектр распадным в первом порядке. Это означает, что одновременно с законом сохранения импульса фононов $k_3 = k_1 + k_2$ может выполняться следующий закон сохранения энергии (условие резонанса):

$$\omega_3 = \omega_1 + \omega_2 \quad (\omega_i \equiv \omega_{k_i}). \quad (1.3)$$

В дальнейшем будет рассмотрен более общий случай спектра $\omega_k = \omega(k)$.

Ограничимся в (1.1) выписанными членами и учтем, что член $\sim \beta^2$ дает нелинейную поправку к частоте:

$$\Delta\omega_k \sim \frac{1}{\omega_k} \beta^2 \sum_{k+h_1=0} V_{kk_1} u_{k_1}^2, \quad V_{kk_1} = V_{k k_1 k_2 k_3} \delta_{kk_2} \delta_{k_1 k_3}. \quad (1.4)$$

Выражение для $\Delta\omega_k$ определено равенством (1.4) с точностью до численного коэффициента, точное значение которого в дальнейшем несущественно. Переходим к переменным действие — фаза (I_k, φ_k) и перепишем полный гамильтониан системы взаимодействующих волн в виде [5]

$$H = \sum_k (\omega_k I_k + \Delta\omega_k(I) I_k) + \beta \sum_{k_1+k_2+k_3=0} \left(\frac{I_{k_1} I_{k_2} I_{k_3}}{\omega_{k_1} \omega_{k_2} \omega_{k_3}} \right)^{1/2} \left\{ V_{k_1 k_2 k_3} \exp\{i(\varphi_{k_1} + \varphi_{k_2} + \varphi_{k_3})\} + 3 V_{k_1, k_2, -k_3} \exp\{i(\varphi_{k_1} + \varphi_{k_2} - \varphi_{k_3})\} + \text{к. с.} \right\} \equiv H_0 + V_{int}; \quad H_0 = \sum_k \omega_k I_k. \quad (1.5)$$

Здесь $\Delta\omega_k(I) = \Delta\omega_k(I_1, I_2, \dots)$ и не зависит от фаз; действие (имеющее смысл числа «квазичастиц») и фаза определены соотношениями:

$$u_k = \sqrt{\frac{I_k}{\omega_k}} e^{i\varphi_k} + \sqrt{\frac{I_{-k}}{\omega_{-k}}} e^{-i\varphi_{-k}}, \quad i_k = i\sqrt{\omega_k I_k} e^{i\varphi_k} - i\sqrt{\omega_{-k} I_{-k}} e^{-i\varphi_{-k}} \quad (1.6)$$

$$\omega_{-k} = \omega_k, \quad V_{k_1 k_2 k_3} = V_{-k_1, -k_2, -k_3}^*,$$

буквы к. с. означают члены, комплексно сопряженные предыдущим.

Введем функцию плотности $f(I, \varphi, t)$ в фазовом пространстве, удовлетворяющую уравнению Лиувилля:

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \sum_k \omega_k \frac{\partial f}{\partial \varphi_k} = \sum_k \left(\frac{\partial V_{int}}{\partial \varphi_k} \frac{\partial f}{\partial I_k} - \frac{\partial V_{int}}{\partial I_k} \frac{\partial f}{\partial \varphi_k} \right) \quad (1.7)$$

и не содержащую никакой дополнительной информации, отличной от решений уравнений движения

$$\dot{\varphi}_k = \omega_k + O(\beta^2), \quad \dot{I}_k = O(\beta).$$

Если перейти к представлению взаимодействия, то второй член в левой части (1.7) исчезает, а в правой части следует всюду заменить φ_k на $\varphi_k - \omega_k t$. Поскольку f есть периодическая функция фаз φ_k , то можно записать

$$f(I, \varphi, t) = \sum_n \{f^{(n)}(I, t) e^{in(\varphi - \omega t)} + \text{к. с.}\}, \quad (1.8)$$

$$(n, \varphi) \equiv \sum_k n_k \varphi_k, \quad f^{(n)} = (f^{(-n)})^*,$$

или в представлении взаимодействия

$$f(I, \varphi, t) = \sum_n \{f^{(n)}(I, t) e^{in(\varphi - \omega t)} + \text{к. с.}\}. \quad (1.9)$$

Пренебрежем временно нелинейной поправкой к частоте. Тогда подстановка (1.5), (1.8) в (1.7) и переход к представлению взаимодействия дает

$$\frac{\partial f^{(n)}}{\partial t} = -i\beta \{Q_{n, n+1} f^{(n+1)} e^{-i[\omega]t} + Q_{n, n-1} f^{(n-1)} e^{i[\omega]t}\}, \quad (1.10)$$

где

$$Q_{n, n\pm 1} = 3 \sum_{k_1 k_2 k_3} \left\{ V_{k_1, k_2, -k_3} \left(\frac{n_{k_1}}{2I_{k_1}} + \frac{n_{k_2}}{2I_{k_2}} - \frac{n_{k_3}}{2I_{k_3}} \pm \frac{\partial}{\partial I_{k_1}} \pm \frac{\partial}{\partial I_{k_2}} \mp \frac{\partial}{\partial I_{k_3}} \right) \left(\frac{I_{k_1} I_{k_2} I_{k_3}}{\omega_{k_1} \omega_{k_2} \omega_{k_3}} \right)^{1/2} \delta_{[k], 0} + \text{к. с.} \right\}; \quad (1.11)$$

$$[\omega] \equiv \omega_{k_1} + \omega_{k_2} - \omega_{k_3}, \quad [k] \equiv k_1 + k_2 - k_3.$$

Кроме того, в выражении для Q отобраны только резонансные члены, для которых выполняются распадные условия (1.3) и которые дают основной вклад в $\partial f / \partial t$.

Проведенный до сих пор вывод уравнения (1.10) такой же, как и при получении основного кинетического уравнения для волн [5]. Существенное отличие в дальнейшем будет связано с двумя факторами: 1) отказом от гипотезы хаотических фаз при выборе начальных условий; 2) учетом нелинейной поправки к частоте $\Delta\omega_k$.

Подожим при $t = 0$

$$f(I, \varphi, 0) = \sum_n \{f^{(n)}(I, 0) e^{in(\varphi - \omega t)} + \text{к. с.}\}. \quad (1.12)$$

Обычно ПХФ эквивалентно начальному условию $f(I, \varphi, 0) = f(I)$, т. е. все $f^{(n)} = 0$ за исключением $n = 0$.

Совершая в (1.10) преобразование Лапласа, получаем

$$pf_p^{(n)} - f^{(n)}(I, 0) = -i\beta \{Q_{n,n-1}f_{p-i[\omega]}^{(n-1)} + Q_{n,n+1}f_{p+i[\omega]}^{(n+1)}\}. \quad (1.13)$$

Из (1.13) следует уравнение для $f_p^{(0)}$:

$$pf_p^{(0)} - f^{(0)}(I, 0) = -i\beta \{Q_{0,-1}f_{p-i[\omega]}^{(-1)} + Q_{0,1}f_{p+i[\omega]}^{(1)}\}. \quad (1.14)$$

Проведем итерацию (1.14) до членов $\sim \beta^2$ включительно:

$$\begin{aligned} pf_p^{(0)} - f^{(0)}(I, 0) &= -i\beta \left\{ Q_{0,-1} \frac{f^{(-1)}(I, 0)}{p - i[\omega]} + Q_{0,1} \frac{f^{(1)}(I, 0)}{p + i[\omega]} \right\} - \\ &- \beta^2 Q_{0,-1} Q_{0,1} \frac{f^{(0)}(I, 0)}{p^2 + [\omega]^2}. \end{aligned} \quad (1.15)$$

Переходя к асимптотике $t \rightarrow \infty$, т. е. $p \rightarrow 0$, и возвращаясь к t -представлению, находим окончательно:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f^{(0)}}{\partial t} &= -i\beta \{Q_{0,-1}e^{-i[\omega]t}f^{(-1)}(I, 0) + Q_{0,1}e^{i[\omega]t}f^{(1)}(I, 0)\} + \\ &+ 6\pi\beta^2 \sum_{h_1 h_2 h_3} \frac{|V_{h_1, h_2, -h_3}|^2}{\omega_{h_1}\omega_{h_2}\omega_{h_3}} \delta([\omega]) \delta_{[h], 0} \left[\frac{\partial}{\partial I} \right] I_{h_1} I_{h_2} I_{h_3} \left[\frac{\partial}{\partial I} \right] f^{(0)}, \\ \left[\frac{\partial}{\partial I} \right] &= \frac{\partial}{\partial I_{h_1}} + \frac{\partial}{\partial I_{h_2}} - \frac{\partial}{\partial I_{h_3}} \end{aligned} \quad (1.16)$$

Отличие уравнения (1.16) от основного кинетического уравнения Пригожина — Браута, имеющего фоккер-планковский вид, заключается в наличии членов $\sim \beta$, сохраняющих фазовую память системы о начальных условиях. Заметим, что если даже $f^{(\pm 1)}(I, 0) = 0$, то члены, содержащие фазовую память, появятся в более высоком порядке по β . Именно, они будут иметь порядок β^{n_0} , где n_0 соответствует наименьшему номеру отличной от нуля гармоники в разложении (1.12).

Для дальнейшего введем функцию распределения $\Phi(I, t)$, получающуюся из $f^{(0)}(I, t)$ усреднением по начальным фазам $\phi_{k,0}$:

$$\Phi(I, t) = (2\pi)^{-N} \int d\phi_{k_1,0} \dots d\phi_{k_N,0} f^{(0)}(I, t), \quad (1.17)$$

где N — число степеней свободы, т. е. число возбужденных в плазме колебаний. При $t = 0$

$$\Phi(I, 0) = f^{(0)}(I, 0).$$

Уравнение для Φ может быть получено из (1.16) путем интегрирования последнего по начальным фазам. Крайне важным является то, что в предположениях, сделанных при выводе (1.16), уравнение для $\Phi(I, t)$ имеет точно такой же вид. Иными словами, усреднение по начальным фазам уравнения (1.16) не меняет его и фазовая память системы сохраняется. Это связано с тем, что (1.16) не содержит пока членов, зависящих от $\phi_{k,0}$. Положение дела меняется, если учсть нелинейную поправку к частоте. Ниже будет показано, что это приводит к зависимости члена первого порядка по β от $\phi_{k,0}$, и получено условие, при котором усреднение по $\phi_{k,0}$ приводит к кинетическому уравнению вида Фоккера — Планка.

2. Анализ уравнений движения

При выполнении резонансных условий (1.3) для некоторых трех волн развивается когерентная, так называемая распадная, неустойчивость [6], приводящая к росту амплитуд колебаний с частотами ω_2, ω_3 . Наличие нелинейной поправки к частоте может привести к нарушению условий резонанса и прекращению неустойчивости. Возможна, однако, следующая ситуация: нарушение условия резонанса некоторого фиксированного колебания ω_1 с парой волн ω_2, ω_3 вследствие нелинейности частот приводит к возможности резонанса между ω_1 и другой парой волн — ω_2', ω_3' . В случае, когда

$$\frac{d\omega_k}{dI_k'} \Delta I_k' \gg \Omega_k, \quad (2.1)$$

гармоника с частотой ω_k быстро выходит из резонанса с любой парой волн из-за сильной нелинейности, но зато всегда попадает в резонанс с какой-либо другой парой волн. Левая часть в (2.1) представляет собой изменение частоты вследствие прохождения через резонанс, а правая часть (согласно (1.2)) — характерное расстояние между гармониками; ΔI_k — изменение числа квазичастиц (действия) при прохождении через резонанс. Условие типа (2.1) рассматривалось в работах [3, 7-9] как условие хаотизации фазы нелинейного колебания во внешнем периодическом поле и перехода от динамического описания системы к статистическому. Ниже мы займемся детальным изучением этого вопроса для уравнения (1.16).

Обратимся временно к исходному уравнению (1.1), из которого следуют (с учетом (1.4)) уравнения движения:

$$\ddot{u}_k + (\omega_k + \Delta\omega_k)^2 u_k \approx F(t), \quad (2.2)$$

$$F(t) = -3\beta \sum_{h_1, h_2 \neq k} V_{kh_1, h_2} u_{h_1} u_{h_2} \delta_{h_1+h_2, k}.$$

Правую часть (2.2) можно рассматривать как внешнюю силу, действующую на k -ю моду. Если воспользоваться для u_k нулевым приближением:

$$u_k = u_k^{(0)} \cos(\omega_k t + \varphi_{k,0}),$$

то

$$\begin{aligned} F(t) &= -3\beta \sum_{h_1, h_2 \neq k} V_{kh_1, h_2} u_{h_1}^{(0)} u_{h_2}^{(0)} \cos(\omega_{h_1} t + \varphi_{h_1,0}) \cos(\omega_{h_2} t + \\ &+ \varphi_{h_2,0}) \delta_{h_1+h_2, k}. \end{aligned} \quad (2.3)$$

Если считать теперь, что характерное расстояние между гармониками спектра Ω_k мало меняется на интервале возбужденного пакета волн, то нетрудно видеть, что (2.3) представляет собой разложение в ряд Фурье некоторой периодической функции с периодом $2\pi/\Omega_k$.

Сделаем теперь очень важное предположение о достаточно большой ширине частотного интервала возбужденных колебаний:

$$N\Omega_k \gg \omega_k, \quad (2.4)$$

где N — число возбужденных колебаний, Ω_k и ω_k относятся к рассматриваемому интервалу частот, достаточно удаленных от правого края пакета. Тогда для таких частот ω_k сила $F(t)$ представляет последовательность очень узких временных импульсов (с шириной $\sim 1/N\Omega_k$), следующих периодически с частотой $\sim \Omega_k$. На каждом импульсе происходит измене-

ние адиабатического инварианта колебания («рассеяние») на величину δI_k . Для оценки δI_k заметим, что вследствие очень узкой (по сравнению с периодом колебания $2\pi/\omega_k$) ширины импульса $F(t)$ его можно заменить приближенно на δ -функцию. Тогда вместо (2.3) получим

$$\ddot{u}_k + (\omega_k + \Delta\omega_k)^2 u_k \approx -F_0 \sum_n \delta(t - 2\pi n/\Omega_k), \\ F_0 \sim V_k I_k / \omega_k \Omega_k, \quad V_k = V_{k, k, 2k}. \quad (2.5)$$

Из (2.5) легко находим

$$\frac{\delta I_{k, (n)}}{I_{k, (n)}} \approx \frac{F_0}{\omega_k u_{k, (n)}^{(0)}} \sin 2\phi_{k, (n)} = \beta \frac{V_k I_{k, (n)}}{\omega_k^2 \Omega_k u_{k, (n)}^{(0)}} \sin 2\phi_{k, (n)}, \quad (2.6)$$

где индекс n внизу относится к рассеянию на n -м импульсе. Вообще уравнение (2.5) может быть заменено следующей системой в конечных разностях:

$$\dot{I}_{k, (n+1)} = I_{k, (n)} + \delta I_{k, (n)}, \\ \Phi_{k, (n+1)} = \Phi_{k, (n)} + 2\pi \frac{\omega_k}{\Omega_k} + \frac{2\pi}{\Omega_k} \sum_{k'} \frac{\partial \Delta\omega_k}{\partial I_{k', (n)}} \delta I_{k', (n)} \sin 2\phi_{k', (n)} = \\ = \Phi_{k, (n)} + 2\pi \frac{\omega_k}{\Omega_k} + \sum_{k'} K_{kk', (n)} \sin 2\phi_{k', (n)}, \quad (2.7)$$

$$K_{kk', (n)} = \frac{2\pi}{\Omega_k} \frac{\partial \Delta\omega_k}{\partial I_{k', (n)}} \delta I_{k', (n)}. \quad (2.8)$$

При $K \gg 1$ фаза колебания сильно меняется в результате рассеяния и можно ожидать (это и будет показано ниже), что в этом случае происходит переход от динамического описания системы к статистическому.

Формулы (2.6), (2.8) можно переписать в более компактном виде, если воспользоваться выражением для инкремента v_k когерентной распадной неустойчивости трех волн (см., например, [1]):

$$\frac{\delta I_{k, (n)}}{I_{k, (n)}} = \frac{v_k}{\omega_k} \sin 2\phi_{k, (n)} \ll 1, \quad \Delta\omega_k \approx \sum_{k'} \frac{v_{k'}^2}{\omega_{k'}}, \\ K_{kk', (n)} \approx \frac{1}{\Omega_k} \frac{v_k v_{k'}^2}{\omega_k \omega_{k'}}, \quad v_k = \beta \frac{V_k I_{k, (n)}}{\omega_k \Omega_k u_{k, (n)}^{(0)}}. \quad (2.9)$$

Если рассмотреть узкий пакет так, что $N\Omega_k \ll \omega_k$, то характерная ширина импульса $F(t)$ становится много больше периода колебания волны. Такая сила является адиабатической. Изменение δI в результате рассеяния экспоненциально мало:

$$\frac{\delta I_k}{I_k} \sim \exp \left\{ -1 / \frac{N\Omega_k}{\omega_k} \right\},$$

и, следовательно, экспоненциально малым оказывается K .

Результаты (2.9) могут быть получены и другим, более общим путем. Решения уравнения (2.2) в интервале между двумя последовательными импульсами может быть представлено в виде решений, возникающих при использовании метода ВКБ [8], примененного ввиду малости нелинейности. Пусть A_0, B_0 — комплексные амплитуды решений до рассеяния и

A, B — после рассеяния. Общее преобразование, связывающее (A, B) с (A_0, B_0) , имеет вид [8]

$$\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b^* & a^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_0 \\ B_0 \end{pmatrix}, \quad |a|^2 - |b|^2 = 1, \quad (2.10)$$

где a, b — некоторые параметры, характеризующие рассеяние. Если положить $B = A^*, B_0 = A_0^*$, то

$$|B|^2 = |A|^2 = I, \quad |B_0|^2 = |A_0|^2 = I_0, \quad (2.11)$$

где I_0, I — соответственно действие до и после рассеяния. Из (2.10), (2.11), находим:

$$\frac{I}{I_0} = \frac{1 + 2\varepsilon \cos(2\varphi_0 + \psi) + \varepsilon^2}{1 - \varepsilon^2}, \quad (2.12)$$

где введены обозначения:

$$A_0 = |A_0| e^{i\varphi_0}, \quad \left| \frac{b}{a} \right| = \varepsilon, \quad \frac{b}{a} = \varepsilon e^{-i\psi}.$$

При $\varepsilon \ll 1$ происходит малое изменение действия $\delta I = I - I_0$. В этом случае из (2.12) следует

$$\delta I/I \approx 2\varepsilon \cos(2\varphi_0 + \psi).$$

Полученное выражение аналогично (2.6). В частности, для уравнения (2.5) $\varepsilon \sim v/\omega$, $\psi \approx -\pi/2$, и мы приходим к формуле (2.9).

В заключение этого раздела отметим, что величина ΔI_k , введенная в (2.1), характеризует изменение действия в результате прохождения отдельного резонанса и не совпадает с δI_k . Проведем оценку ΔI_k . В резонансе к основному колебанию добавляется вынужденное с амплитудой $\Delta u_k \sim \beta V_k u_k^2 / \Delta$, где Δ — отклонение частоты от резонансного значения. В данном случае расстройка частоты связана с ее нелинейной зависимостью от u_k , т. е.

$$\Delta \sim \frac{\partial \omega_k}{\partial I_{k'}} \Delta I_{k'}.$$

Отсюда

$$\frac{\Delta I_{k'}}{I_{k'}} = \frac{\Delta u_{k'}}{u_{k'}} \sim \beta V_k u_{k'} \left| \left(\frac{\partial \omega_k}{\partial I_{k'}} \Delta I_{k'} \right) \right|$$

или

$$\Delta I_{k'} = \left(\beta V_k u_{k'} I_{k'} \left| \frac{\partial \omega_k}{\partial I_{k'}} \right| \right)^{1/2}. \quad (2.13)$$

Подстановка (2.13) в (2.1) дает

$$\frac{\partial \omega_k}{\partial I_{k'}} \frac{\beta V_k u_{k'} I_{k'}}{\Omega_k^2} = \frac{v_{k'}^2 v_k}{\omega_{k'} \omega_k \Omega_k} = K_{kk'} \gg 1. \quad (2.14)$$

Таким образом, условие (2.1) означает, согласно (2.7), очень быстрое изменение фазы колебания вследствие рассеяния.

Полученные выше результаты позволяют перейти к решению основного вопроса — выводу условия, при котором можно перейти от динамического описания к статистическому для системы (1.5).

3. Вывод условий хаотизации фаз волн

Обратимся к уравнению (1.16) и учтем теперь нелинейную поправку к частоте $\Delta\omega$. Как было показано в предыдущем разделе, взаимодействие данного колебания со всеми остальными сводится к эффективному рас-

сиянию фона на периодически во времени и изменению действия на величину δI за один акт рассеяния. Это означает, что величина $\Delta\omega(I)$ является функцией времени. Учитем это обстоятельство в множителях $\exp\{\pm i[\omega]t\}$, входящих в (1.16) в члены $\sim \beta$. Для этого заметим, что, согласно (1.6),

$$(\omega + \Delta\omega)t = \varphi(t) - \varphi_{(0)} = \varphi_{(m)} - \varphi_{(0)}, \quad (3.1)$$

где m — число актов рассеяния к моменту времени t : $m \approx t\Omega_h \gg 1$. С помощью (2.7) получаем

$$\begin{aligned} (\omega_h + \Delta\omega_h)t &= \varphi_{h,(m-1)} + 2\pi \frac{\omega_h}{\Omega_h} + \sum_{h'} K_{hh'} \sin 2\varphi_{h',(m-1)} - \varphi_{h,(0)} = \\ &= \varphi_{h,(m-2)} + 4\pi \frac{\omega_h}{\Omega_h} + \sum_{h'} K_{hh'} \sin 2\varphi_{h',(m-2)} + \\ &+ \sum_{h'} K_{hh'} \sin 2 \left\{ \varphi_{h',(m-2)} + \sum_{h''} K_{h'h''} \sin 2\varphi_{h'',(m-2)} \right\} - \varphi_{h,(0)} = \dots \end{aligned} \quad (3.2)$$

После окончания процесса итерации в (3.2) величина $(\omega_h + \Delta\omega_h)t$ будет выражена как функция t (номера m) и $\varphi_{h,(0)}$.

Для функции Φ , как уже отмечалось в разделе 1, уравнение (1.16) принимает вид

$$\begin{aligned} \frac{\partial\Phi}{\partial t} &= -i\beta \{ Q_{0,-1} \langle e^{-i[\Phi(t)-\varphi_{(0)}]} \rangle f^{(-1)}(I, 0) + \\ &+ Q_{0,+1} \langle e^{i[\Phi(t)-\varphi_{(0)}]} \rangle f^{(+1)}(I, 0) \} + \\ &+ 6\pi\beta^2 \sum_{h_1 h_2 h_3} \frac{|V_{h_1, h_2, -h_3}|^2}{\omega_{h_1}\omega_{h_2}\Omega_{h_3}} \delta[\omega]\delta_{[h],0} \left[\frac{\partial}{\partial I} \right] I_{h_1} I_{h_2} I_{h_3} \left[\frac{\partial}{\partial I} \right] \Phi, \end{aligned} \quad (3.3)$$

$$[\varphi(t) - \varphi_{(0)}] \equiv \varphi_{h_1}(t) - \varphi_{h_1,(0)} + \varphi_{h_2}(t) - \varphi_{h_2,(0)} - \varphi_{h_3}(t) + \varphi_{h_3,(0)},$$

где под знаком δ -функции можно сохранить только линейные частоты, что будет оправдано впоследствии. Кроме того, обозначено

$$\langle \dots \rangle \equiv (2\pi)^{-N} \int \dots d\varphi_{1,(0)} \dots d\varphi_{N,(0)}.$$

Рассмотрим теперь два предельных случая. Пусть $K \ll 1$ почти на всем интервале рассматриваемых частот. Тогда

$$(\omega + \Delta\omega)t = \omega t + O(K), \quad \langle e^{\pm i[\omega + \Delta\omega]t} \rangle = e^{\pm i[\omega]t} (1 + O(K)). \quad (3.4)$$

Из (3.4) следует, что уравнение для Φ имеет точно такой же вид, что и уравнение (1.16) для $f^{(0)}$, и фазовая память в системе сохраняется.

Пусть теперь $K_{hh'} \gg 1$ почти для всех k, k' . В этом случае, оставляя в (3.2) наиболее быстро меняющиеся члены, имеем

$$\begin{aligned} \varphi_h(t) - \varphi_{h,(0)} &= (\omega_h + \Delta\omega_h)t \approx \omega_h t - \varphi_{h,(0)} + \\ &+ \sum_{h_1} K_{hh_1} \sin \left\{ \sum_{h_2} K_{h_1 h_2} \sin \left[\sum_{h_3} K_{h_2 h_3} \dots \right. \right. \\ &\dots \left. \left. \sin \left(\sum_{h_m} K_{h_{m-1}, h_m} \sin 2\varphi_{h_m,(0)} \right) \dots \right] \right\}. \end{aligned} \quad (3.5)$$

Учитывая, что $K_{hh'} \gg 1$, оценку нужного нам интеграла можно провести методом стационарной фазы. Это дает

$$\langle e^{\pm i[\omega + \Delta\omega]t} \rangle \sim e^{-t/\tau}, \quad \tau^{-1} = 1/2\Omega N \ln K, \quad (3.6)$$

где Ω и K — некоторые средние по пакету величины Ω_h и $K_{hh'}$.

Полученный результат решает задачу. За время порядка τ члены первого порядка по β в (3.3) исчезают, и уравнение для Φ принимает вид уравнения Фоккера — Планка:

$$\frac{\partial\Phi}{\partial t} = 6\pi\beta^2 \sum_{h_1 h_2 h_3} \frac{|V_{h_1, h_2, -h_3}|^2}{\omega_{h_1}\omega_{h_2}\Omega_{h_3}} \delta[\omega]\delta_{[h],0} \left[\frac{\partial}{\partial I} \right] I_{h_1} I_{h_2} I_{h_3} \left[\frac{\partial}{\partial I} \right] \Phi. \quad (3.7)$$

Время τ , таким образом, можно рассматривать как время исчезновения фазовой корреляции в системе (1.1). Равновесным решением (3.7) является Φ , для которого [5]

$$\langle I_h/\omega_h \rangle = \text{const}, \quad (3.8)$$

где скобки $\langle \dots \rangle$ означают усреднение по Φ .

Характерное время τ_0 установления стационарного состояния определяется из (3.7): $\tau_0 \sim v^2/\omega$. Это время должно быть много больше времени, связанного с размытием $\delta([\omega])$ в (3.7) вследствие нелинейной поправки к частоте. Согласно (2.9) это дает

$$\tau_0 \omega^2/v^3 \sim \omega/v \gg 1.$$

Последним неравенством оправдано пренебрежение нелинейными поправками к частоте в аргументе δ -функции, входящей в (3.3).

Из (3.7) сразу следует кинетическое уравнение для волн [1]. Действительно, умножая (3.7) на I_h и интегрируя по всему фазовому пространству функции Φ , находим

$$\begin{aligned} \frac{\partial \langle I_h \rangle}{\partial t} &= 18\pi\beta^2 \sum_{h_1 h_2 h_3} \frac{|V_{h_1, h_2, -h_3}|^2}{\omega_{h_1}\omega_{h_2}\Omega_{h_3}} \delta(\omega_{h_1} + \omega_{h_2} - \omega_{h_3}) (\delta_{h_1 h} + \delta_{h_2 h} - \\ &- \delta_{h_3 h}) \delta_{h_1+h_2, h_3} (\langle I_{h_2} I_{h_3} \rangle + \langle I_{h_1} I_{h_3} \rangle - \langle I_{h_1} I_{h_2} \rangle). \end{aligned} \quad (3.9)$$

Учитывая свойства симметрии $V_{h_1, h_2, -h_3}$, (1.6) и делая, как обычно, предположение о расцеплении моментов

$$\langle I_{h_1} I_{h_2} \rangle = \langle I_{h_1} \rangle \langle I_{h_2} \rangle,$$

получаем

$$\begin{aligned} \frac{\partial \langle I_h \rangle}{\partial t} &= 18\pi\beta^2 \sum_{h_1 h_2} \frac{|V_{h_1, h_2, -h_3}|^2}{\omega_{h_1}\omega_{h_2}\Omega_h} \{ 2[\langle I_{h_1} \rangle \langle I_{h_2} \rangle + \\ &+ \langle I_{h_1} \rangle \langle I_{h_3} \rangle - \langle I_{h_2} \rangle \langle I_{h_3} \rangle] \delta(\omega_h + \omega_{h_1} - \omega_{h_2}) \delta_{h+h_1, h_2} - \\ &- [\langle I_{h_1} \rangle \langle I_{h_1} \rangle + \langle I_{h_2} \rangle \langle I_{h_2} \rangle - \langle I_{h_1} \rangle \langle I_{h_2} \rangle] \delta(\omega_h - \omega_{h_1} - \omega_{h_2}) \delta_{h, h_1+h_2} \}. \end{aligned} \quad (3.10)$$

4. Обсуждение результатов

1. Как было показано в предыдущем разделе, выполнение условия (2.14) почти для всех k, k' приводит к хаотизации фаз волн за время порядка τ . Полученный результат имеет наглядную интерпретацию. Хорошо известно, что в статистической системе имеет место очень сильная неустойчивость траекторий движения относительно малых возмущений начальных условий. Это означает, что две фазовые точки, начав движение

ние с близкими начальными условиями, могут разойтись через некоторое время сколь угодно далеко друг от друга. Рассмотрим для простоты изменение фазы отдельного колебания. Пусть $d\phi_{k(n)}$ есть расстояние между двумя значениями фазы на единичной окружности в момент времени, характеризуемый номером n . Тогда согласно (2.7)

$$\frac{d\phi_{k(n+1)}}{d\phi_{k(n)}} = K_{kk'} \cos 2\Phi_{k(n)} \equiv T_n(k, k'). \quad (4.1)$$

При $K_{kk'} \gg 1$ преобразование (4.1) является преобразованием растяжения, исключая малую область $\phi_{k'}$ размером $\sim K^{-1} \ll 1$. Ввиду большого числа степеней свободы статистический вес подобного рода областей в течение времени, соответствующего $m \gg 1$ шагов, очень мал. Поэтому, преобразование T_n , будучи примененным достаточно большое число раз при $K \gg 1$ ¹⁾, и означает наличие неустойчивости, о которой говорилось выше. Условие $K \sim 1$ можно рассматривать как границу стохастичности.

2. Остановимся на следствиях из условия хаотизации фаз (2.14). Перешифтуем его в виде

$$K_{kk'} = \frac{\partial \Delta\omega_k}{\partial I_{k'}} I_{k'} \frac{\nu_k}{\omega_k} \frac{1}{\Omega_k} \gg 1, \quad (4.2)$$

или, как это бывает для большинства реальных систем в плазме, $\Delta\omega$ зависит степенным образом от I , так что

$$K_{kk'} = \frac{\Delta\omega_{kk'}}{\Omega_k} \frac{\nu_k}{\omega_k} \gg 1, \quad \Delta\omega_k = \left| \sum_{k'} \Delta\omega_{kk'} \right|. \quad (4.3)$$

Кроме того, обычно $K_{kk'}$ есть положительная степень k, k' . Отсюда следует, что колебания с достаточно длинными волнами не хаотизируются. Для уравнения (3.10) существует граница k_0 , ниже которой оно теряет смысл. Величина k_0 может быть получена из оценки

$$K_{kk_0} \sim 1. \quad (4.4)$$

Действие нижней границы k_0 аналогично наличию отражающей стенки для квазичастиц [3]. Из (4.2) следует также, что в областях аномальной дисперсии, где

$$\Omega_k = \frac{\partial \omega_k}{\partial k} \Delta k \rightarrow \infty$$

может произойти срыв стохастичности. Кроме того, для выполнения (4.2) нелинейность $\Delta\omega$ должна быть достаточно большой.

3. В рассматриваемой до сих пор модели условие резонансов

$$\sum_j n_j \omega_j = 0 \quad (4.5)$$

имело вид

$$\omega_{k_1} = \omega_{k_2} + \omega_{k_3}, \quad k_1 = k_2 + k_3. \quad (4.6)$$

Выполнение (4.6) обеспечивается соответствующим видом закона дисперсии $\omega = \omega(k)$. Может оказаться, что для рассматриваемого спектра $\omega(k)$ процессы типа (4.6) запрещены, и резонансные условия удовлетворяются только для большего числа волн, чем три. Так, например, кинетическое уравнение в предположении хаотических фаз для четырехплаз-

¹⁾ При переходе к сплошному спектру $\Omega_k \rightarrow 0$ и условие $K \gg 1$, казалось бы, всегда выполняется. Однако в действительности такой переход требует специального исследования.

мальных взаимодействий было получено в [10]. В произвольном случае критерий (4.3) может быть сохранен с соответствующей заменой величин $\Delta\omega$ и ν_k . Задача, рассмотренная в [3], относится к спектру $\omega(k)$, для которого процесс (4.6) запрещен и возможны распады только в следующем порядке.

Выполнение условий (4.5) обеспечивает возможность появления «затравочной» (распадной) неустойчивости. Последняя приводит к существенному изменению адиабатического инварианта колебания.

Новосибирский государственный
университет

Поступила в редакцию
29 ноября 1966 г.

Литература

- [1] А. А. Галеев, В. И. Карпман. ЖЭТФ, 44, 592, 1963.
- [2] E. Fermi, J. Pasta, S. Ulam. Studies of nonlinear problems, Los Alamos Scientific Report, LA — 1940, 1955.
- [3] Ф. М. Израйлев, Б. В. Чирков. ДАН СССР, 166, 57, 1966.
- [4] R. Broult, I. Prigogine. Physica, 22, 621, 1956.
- [5] И. Пригожин. Неравновесная статистическая механика, Изд. «Мир», 1964, гл. 2.
- [6] В. Н. Ораевский, Р. З. Сагдеев. ЖТФ, 32, 1291, 1962.
- [7] Б. В. Чирков. Атомная энергия, 6, 630, 1959.
- [8] Г. М. Заславский. ПМТФ, 2, 1967.
- [9] M. N. Rosenbluth, R. Z. Sagdeev, J. B. Taylor, G. M. Zaslavskii. Nucl. Fus., 6, 4, 1966.
- [10] В. Е. Захаров. ЖЭТФ, 51, 688, 1966.

ON THE LIMITATIONS OF STATISTICAL DESCRIPTIONS OF A WAVE FIELD

G. M. Zaslavsky, R. Z. Sagdeev

A set of nonlinear interacting oscillations with a small nonlinearity in a dispersive medium is considered. The condition which must be satisfied in order that the system may be approximately described statistically is derived. The criterion for wave phase randomization due to nonlinear interaction is obtained and the characteristic time for loss of phase memory in the system is found. As a result a kinetic equation for waves can be deduced without making any apriori assumptions regarding the random initial phases. The spectral boundaries of applicability are found and the relation between the randomization time of the phases and the instability decay increment is established.